

هشدار جدی جهاد کشاورزی گیلان برای مقابله با «بلاست»

ره‌نگاران / رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر لزوم توجه به توصیه‌های پیشگیرانه برای بیماری بلاست برنج از شالیکاران استان خواست تا با پایش دقیق مزارع خود از بروز این بیماری پیشگیری کنند.

به گزارش [پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران](#)؛ صالح محمدی با تاکید بر اینکه شالیکاران در صورت مشاهده نخستین علائم، نسبت به مبارزه شیمیایی با سموم مناسب و توصیه شده اقدام کنند اظهار کرد: برای کنترل به موقع و مناسب طبق نظر کارشناسان، مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی اقدام شود.

وی بیان کرد: بیماری بلاست برنج سبب کاهش میزان محصول و افزایش درصد شکستگی دانه‌ها هنگام تبدیل می‌شود از اینرو پیشگیری از این بیماری اهمیت بسزایی دارد.

بیماری بلاست بیماری‌های قارچی در مزارع برنج است که می‌تواند خسارت قابل توجهی به بار آورد؛ این بیماری باعث کاهش عملکرد محصول، کاهش کیفیت دانه و افزایش درصد خرد شدن دانه‌ها در هنگام تبدیل می‌شود.

کشاورزان برای جلوگیری از بیماری بلاست از قارچ کش استفاده کنند

ره‌نگاران/ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به خطر افزایش شدت بیماری قارچی بلاست در شالیزارهای استان، تصریح کرد: خطر کاهش کمیت و کیفیت محصول در اثر بیماری بلاست وجود دارد.

به گزارش [بایگاہ اطلاع رسانی ره نگاران](#)؛ مهدی عبادت طلب ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی‌های پیش‌آگاهی صادر شده با توجه به شرایط آب و هوایی جاری، مزارعی که در ابتدای خوشه دهی در حد 30 تا 40 درصد ظهور خوشه هستند، در صورت وجود عامل بیماری در مزرعه با نظر کارشناسان زیربط مبارزه شیمیایی با بیماری قارچی بلاست را در دستور کار قرار دهند، زیرا اگر این بیماری کنترل و مدیریت نشود، ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش عملکرد و کیفیت برنج را در پی خواهد داشت.

وی شرایط مناسب آب و هوایی برای گسترش بیماری را شامل رطوبت بالای 90 درصد و دمای 18-28 درجه سانتیگراد دانست که مستعد توسعه بیماری قارچی بلاست به ویژه در ارقام محلی است و گفت: این بیماری در مرحله برگ سبب کاهش سطح سبز برگ و در نتیجه کاهش غذاسازی و رشد بهینه گیاه خواهد شد و در مرحله خوشه به صورت بلاست سنبلچه‌ها و گردن خوشه بروز می‌یابد، بلاست سنبلچه‌ها سبب کاهش کیفیت و خرد شدن دانه‌ها در زمان فراوری شده اما بلاست گردن خوشه بیشترین خسارت را به بار می‌آورد و با قطع رابطه غذایی گیاه از ریشه به خوشه، موجب پوکی و خشک شدن کامل آن می‌شود.

عبادت طلب با بیان اینکه بهتر است در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و وجود بیماری بلاست برگ در مزرعه، کشاورزان برای اطمینان از سلامت مزرعه و حفظ عملکرد در زمان مناسب از یک مرحله قارچ کش استفاده کنند، یادآور شد: استفاده از سموم قارچ کش مناسب با هماهنگی مدیریت‌های جهاد کشاورزی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی باشد.